3199		セルリー	トップセラー

施肥　　有機質･土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	ﾒｰｶｰ(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 化成窒素kg	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 化成窒素kg
岩塩(紅色岩塩)	紅色岩塩(ヒマラヤ産)塩化マグネシウム			0						追肥	500g	生育期	2	0.0	500g	11月～4月	5	0.0
CDUS400	化成肥料	JAおきなわ	15	15	6	6	6	6		元肥	80g	定植時	1		80g	8月	1	12.0
高度化成肥料14-14-14	セロリ部会(4名)	JAおきなわ	14	14	14	14	14	14		追肥	40g	追肥	1		40g	11月	1	5.6
マックス(牛ふん堆肥)	牛ふん･剪定木チップ	城間農園		0					100	元肥	750g	定植前	1	0.0	750g	8月	1	0.0
コフナ	微生物	ニチモウ(株)		0					100	土壌改良	15kg	定植前	1	0.0	15kg	8月	1	0.0
スーパーS	サポニン･ケイ酸	エキスパートファーム		0						植物活性	100ml	発生時		0.0	100ml	10日に1回	4	0.0
スーパー酵素	乳酸菌･酵母菌･納豆菌･ミネラル	エキスパートファーム		0						植物活性	200ml	発生時		0.0	200ml	10日に1回	4	0.0

【慣行農法との比較】

*化学肥料

窒素分で比較して　当地比　6 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	52
計画使用量	17.5

*節減対象農薬

当地比　6 割減

節減対象農薬	使用回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	4	13

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	ﾒｰｶｰ(購入先)	使用目的	計画 希釈倍率	計画 使用量	計画 使用時期	計画 回数	計画 カウント	実績 希釈倍率	実績 使用量	実績 使用時期	実績 回数	実績 カウント	使用回数上限 商品	使用回数上限 成分
殺虫	ランネート45DF	メソミル	JAおきなわ	アブラムシ、ハスモンヨトウ	1000	100L	発生時			1000	100L	発生時	1	1	2	2
殺虫	スピノエース顆粒水和剤	スピノサド	JAおきなわ	ハモグリバエ	2500	100L	発生時			2500	100L	発生時	1	0	3	3
殺菌	トップジンM水和剤	チオファネートメチル	JAおきなわ	斑点病	1500	100L	発生時			1500	100L	発生時	1	1	2	3
殺菌	ダコニール1000	TPN	JAおきなわ	斑点病	1000	100L	発生時			1000	100L	発生時	1	1	2	2
殺菌	アミスター20フロアブル	アゾキシストロビン	JAおきなわ	斑点病	2000	100L	発生時			2000	100L	発生時	1	1	4	4

	計画（作業、施肥、防除など）	実績（作業）
1月	収穫、定植	
2月	収穫	
3月	収穫	
4月	収穫、耕起	8/3～ 耕起
5月	収穫、耕起	耕起
6月	耕起	耕起
7月	耕起	耕起
8月	耕起、播種、施肥	8/3～ 耕起、8/3～ 播種
9月	耕起、定植、播種	耕起、9/1～ 定植、播種
10月	耕起、施肥、定植、播種	耕起、定植、播種
11月	耕起、定植、播種、施肥	～11/1 播種、耕起、定植
12月	耕起、収穫、定植	耕起、定植、12/9～収穫

耕起開始:	令和5年8月3日
終了:	令和5年12月
播種開始:	令和5年8月3日
終了:	令和5年11月1日
定植開始:	令和5年9月1日
終了:	令和6年1月20日
収穫開始:	令和5年12月19日
終了:	令和6年5月初旬