2262	村井　成一	メロン	天恵(青肉)・ルピアレッド(赤肉)

施肥　　有機質・土壌改良剤・化学肥料など（購入の場合はメーカー名記入）

＜土づくりの使用資材・肥料について＞

使用量はkg/10a

商品名	原料	メーカー(購入先)	全N%	化成N%	全P%	化成P%	全K%	化成K%	有機率(%)	使用目的	計画				実績			
											使用量	使用時期	回数	化成窒素kg	使用量	使用時期	回数	化成窒素kg
ボルミックス	放線菌、酵素	(株)五光	4	0	2		1		100	元肥	20	9月	1		20	9月	1	
ヨードコロイド	酵素ハビイル酸	(株)五光	8	0	7		2		100	元肥	20	9月	1		20	9月	1	
萌　酵素	アミノ酸液肥	バイオ　研		0					100	追肥	100L	9月	1		100L	9月	1	
シンボル808	Mg　2%、 ホウ素　0.06%	(株)五光	8	0	10		8		100	追肥	40	4月	1		40	4月	1	
有機入り839S		JA	8		3		9		0	追肥	30	4月	1	2.4	30	4月	1	2.4

【慣行農法との比較】

***化学肥料**

窒素分で比較して　当地比　8 割減

化学肥料	窒素使用量(kg/10a)
慣行使用量	13
実績使用量	2.4

***節減対象農薬**

当地比　5 割減

節減対象農薬	計画回数	地域の慣行防除
土壌消毒剤		
除草剤		
殺虫剤		
殺菌剤		
その他薬剤		
合計	6	14

病虫害の防除　　使用した天然防除資材・自作資材・農薬（成長調整剤、展着剤等を含む）

使用量/10a

分類	商品名	原料/成分名	メーカー(購入先)	使用目的	計画					実績					使用回数上限	
					希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	希釈倍率	使用量	使用時期	回数	カウント	商品	成分
殺虫	マブリック水和剤20	フルバリネート		殺虫			発生時	2	2						2	2
殺虫	ネキリエースK	イソキサチオン		コオロギ	－		発生時	1	1						1	1
殺菌	トリフミン水和剤	トリフルミゾール		うどんこ病			発生時	2	2						5	5
殺菌	トップジンMペースト	チオファネートメチル		キンカク病	－		発生時	1	1						1	5

	計画(作業、施肥、防除など)	実績(作業)
1月		
2月		
3月	播種	3/10～4/10　播種
4月	播種、定植	4/1～5/1　耕起、 4/12～5/8　定植
5月	定植	
6月		
7月	7/10～　収穫開始	
8月	8/中旬　終了	
9月		
10月		
11月		
12月		

耕起開始:	平成30年4月1日
終了:	平成30年5月1日
播種開始:	平成30年3月10日
終了:	平成30年4月10日
定植開始:	平成30年4月12日
終了:	平成30年5月8日
収穫開始:	平成30年7月10日
終了:	平成30年8月15日